Cao Trinh nữ hoàng cung

Tên gọi: Crinum latifolium L. extract

Xuất hiện: bột màu nâu, nâu nhạt.

Quy cách: 25kg/thùng

Xuất xứ: Việt Nam

Thành phần: Trinh nữ hoàng cung tỷ lệ 10:1

Độ ẩm: 5%

Trinh nữ hoàng cung có tên khoa học là **Crinum latifolium L.**. **Cao khô trinh nữ hoàng cung** có màu nâu, nâu nhạt, được chiết xuất theo hoạt chất chính hoặc theo tỷ lệ. Cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) họ thủy tiên (Amaryllidaceae), Cây cỏ lớn. Thân hành to, gần hình cầu hoặc hình trứng thuôn, đường kính 8-10 cm, phủ bởi những vảy hình bản to, dày, màu trắng. Lá mọc thẳng từ thân hành, hình dải dài đến 50 cm, có khi hơn, rộng 7- 10cm, mép nguyên, gốc phẳng có bẹ, đầu nhọn hoặc tù, gân song song. Cụm hoa mọc thành tán trên một cán dẹt, dài 30- 40cm; lá bắc rộng hình thìa dài 7 cm, màu lục, đầu nhọn; hoa màu trắng pha hồng, dài 10- 15 cm; bao hoa gồm 6 phiến bằng nhau, hàn liền 1/3 thành ống hẹp, khi mở đầu phiến quăn lại; nhị 6; bầu hạ. Quả hình cầu (ít gặp). Mùa hoa quả: tháng 8-9.

Thành phần chính của thảo dược trinh nữ hoàng cung là các Alcaloid, saponin, acid hữu cơ. Trinh nữ hoàng cung đượng nghiên cứu về thành phần hóa học chủ yếu từ năm 1980. Các Alcaloid có trong trinh nữ hoàng cung thuộc 2 nhóm: – Không dị vòng: latisolin, latisodin, beladin. – Dị vòng: ambelin, crinafolin, latisodin, crinafolidin, 11-O- acetyllambelin, latindin, pratorimin… Thân rễ chứa 2 glucan: Glucan A và glucan B. Glucan A gồm 12 đơn vị glucose, còn glucan B có khoảng 110 gốc của glucose (Tomada Mashashi và cs, 1985). Ở Việt Nam, theo Nguyễn Hoàng và cs, 1997, trinh nữ hoàng cung có 11 alcaloid, 11 acid amin, acid hữu cơ. Các acid amin là phenylalanin, 1- leucin, dl- valin và 1.arginin monohydroclorid. Trần Văn Sung và cs, 1997, đã phân lập được từ thân hành trinh nữ hoàng cung 5 alcaloid trong đó 2 chất là 1.lycorin và pratorin được nhận dạng bằng phổ khối lượng và phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton carbon 13. Võ Thị Bạch Huệ và cs, 1998, đã phân lập được từ lá 2 alcaloid là crinamidin, 6- hydroxycrinamidin được nhận dạng bằng các phân tích hóa học và quang phổ.

Dạng thành phẩm: *chiết xuất theo tỷ lệ.*

Chức năng chính của cao khô trinh nữ hoàng cung:

Hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng và u xơ tiền liệt tuyến

Sử dụng cao khô trinh nữ hoàng cung

Cao khô Trinh nữ hoàng cung được ứng dụng rộng rãi trong các sản phẩm hiện đại. Chúng được sử dụng để sản xuất:

– Dược phẩm.

– Thực phẩm chức năng.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Nguyễn Mạnh Cường

Công ty TNHH Dược phẩm sinh học Quốc tế (IBPHARCO)

Add: Tầng 6, Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0987 785 792 - Tel: 024 62939301

Email: cuongnm@ibpharco.com - Web: www.ibpharco.com

Bình luận

Bài viết liên quan

Công ty Biogreen cung cấp men Bacillus subtilis dạng nước, dạng dịch

Công ty Biogreen bán bột tỏi đen Lý Sơn

Công ty Biogreen bán bột tỏi đen Lý Sơn

Công ty Biogreen bán cao khô Dừa cạn tan hoàn toàn

Biogreen cung cấp nguyên liệu cao khô Trinh nữ hoàng cung

Bán cao khô Actiso giúp thanh nhiệt, mát gan

Cung cấp cao khô Chùm ngây tan hoàn toàn

Bán cao khô Thông đất tan hoàn toàn

Bán cao dược liệu phục vụ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Bán enzyme: Amylase, Protease, Lactase, Lipase

Bán các loại cao khô dược liệu

Bán men vi sinh B.subtilis, B.coagulans, B.clausii

Công ty Biogreen cung cấp nguyên liệu Papain

Công ty Biogreen cung cấp nguyên liệu men vi sinh

Bán nguyên liệu Papain

Chuyên cung cấp các loại cao dược liệu

Bán nguyên liệu men vi sinh

Bán nguyên liệu enzyme

Bán men vi sinh phục vụ sản xuất thực phẩm chức năng

EDTA Hà Lan 2 muối. 4 muối, dạng nước chất lượng, độ tinh khiết cao

Mua bán men vi sinh đơn dòng, men tiêu hóa, men đường ruột giá tốt

Mua bán yucca tẩy kháng sinh, hấp thu khí độc, yucca nước, yucca bột, yucca lỏng, giá sỉ

cung cấp yucca nguyen liệu mexico

Cao Khô Dược Liệu

Men tiêu hóa nguyên liệu

Hạ Đường Huyết Y Sư

Cung cấp các loại cao dược liệu theo yêu cầu khách hàng

Cung cấp các loại cao dược liệu theo yêu cầu khách hàng

Bán nguyên liệu: papain, pepsin, bromelain, protease

Cung cấp nguyên liệu Papain từ 50.000 IU/g đến 1.000.000 IU/g